



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS

Cargo: **Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família**

CÓDIGO DA PROVA

S02V
TARDE

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas, de acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
RESPOSTAS, A FRASE DE WALTER GRANDO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

“Saibas que a felicidade estará em todos os momentos que permitires senti-la.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde – SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Reserve os 30 minutos finais para marcar seu cartão de respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 10.

Casa de pensão

João Coqueiro, quando saiu do Hotel dos Príncipes na manhã do almoço, ia preocupado [...] e correu logo para casa.

Ao chegar foi direto à mulher [...]

– Sabes? disse ele, sem transição, assentando-se ao rebordo da cama. – É preciso arranjarmos cômodo para um rapaz que há de vir por aí domingo. [...]

– É um achado precioso! Ainda não há dois meses que chegou do Norte, anda às apalpadelas! Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna! [...]

Mme. Brizard escutava, sem desprezar os olhos de um ponto, os pés cruzados e com uma das mãos apoiando-se no espaldar da cama.

– Ora, continuou o outro gravemente. – Nós temos de pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!... se não abirmos os olhos... adeus casamento!

– Mas daí... perguntou a mulher, fugindo a participar da confiança que o marido revelava naquele plano.

– Daí – é que tenho cá um palpite! explicou ele. – Não conheces o Amâncio!... A gente leva-o para onde quiser!... Um simplório, mas o que se pode chamar um simplório.

Mme. Brizard fez um gesto de dúvida.

– Afianço-te,olveu Coqueiro – que, se o metermos em casa e se conduzirmos o negócio com um certo jeito, não lhe dou três meses de solteiro!

[...]

– Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo, e já! Tu – fala com franqueza à Amelinha; a mim não fica bem... [...]

Nessa mesma tarde Mme. Brizard entendeu-se com a cunhada. Falou-lhe sutilmente no “futuro”, disse-lhe que “uma menina pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e alguma esperteza poderia apanhar um marido rico”.

[...]

Amélia riu, concentrou-se um instante e prometeu fazer o que estivesse no seu alcance, para agradar ao tal sujeitinho.

Ardia, com efeito, por achar marido, por se tornar dona de casa. A posição subordinada de menina solteira não se compadecia com a sua idade e com as desenvolturas do seu espírito. Graças ao meio em que se desenvolveu, sabia perfeitamente o que era pão e o que era queijo; por conseguinte as precauções e as reservas, que o irmão tomava para com ela, faziam-na sorrir.

Às vezes tinha vontade de acabar com isso. “Que diabo significavam tais cautelas?... Se a

supunham uma toleirona, enganavam-se – ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!”

– Agora, por exemplo, neste caso do tal Amâncio, que custava ao Coqueiro explicar-se com ela francamente?...[...] Mas, não senhor! – meteu-se nas encolhas e entregou tudo nas mãos da mulher!

[...]

E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão.

– Ele já a devia conhecer melhor! pelo menos já devia saber que aquela que ali estava era incapaz de cair em qualquer asneira; aquela não “dava ponto sem nó”. Outra, que fosse, quanto mais – ela, que conhecia os homens, como quem conhece a palma das próprias mãos! – Ela, que vira de perto, com os seus olhos de virgem, toda a sorte de tipos! – ela, que lhes conhecia as manhas, que sabia das lábias empregadas pelos velhacos para obter o que desejam e o modo pelo qual se portam [...!] – Ela! tinha graça!

AZEVEDO, Aluisio. *Casa de pensão*. São Paulo: Ática, 1992, p.71-73. (Fragmento).

Vocabulário:

Meteu-se nas encolhas: calou-se.

Questão 01

Mme. Brizard fica incumbida de falar com Amélia sobre o plano do casamento. Que argumento ela usa para convencer a cunhada?

- A gente leva-o para onde quiser!... Um simplório, mas o que se pode chamar um simplório.”
- Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo, e já!
- “Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna!”
- “uma menina pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e alguma esperteza poderia apanhar um marido rico”.
- “Nós temos de pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!...”

Questão 02

Percebe-se, pelo fragmento em análise, que:

1. a moça se irritou com os cuidados do irmão que a imaginava uma tola, fria, calculista mas cheia de ilusões românticas.
2. ao apontar a reflexão de Amélia sobre o estratagema que lhe foi apresentado, o narrador oferece ao leitor uma caracterização bastante crua da personagem.
3. Amélia mantinha-se casta ainda, pois sabia que esse era o “bem mais precioso” que tinha para garantir um casamento.

Está correto o que apresenta em:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 2, apenas.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Outra, que fosse, quanto mais – ela, que conhecia os homens”, leia as afirmativas.

- I. O segundo QUE é uma conjunção adverbial.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso oblíquo.
- III. OUTRA é um pronome adjetivo indefinido.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) I.
- C) I e II.
- D) III.
- E) I e III.

Questão 04

O segmento “Às vezes tinha vontade de acabar com isso. “Que diabo significavam tais cautelas?... Se a supunham uma toleirona, enganavam-se – ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!” está substancialmente marcado pelo uso do:

- A) pretérito imperfeito do indicativo, representando o fato como não concluído, situando-o em um espaço de tempo simultâneo a um ponto de referência passado.
- B) pretérito imperfeito do subjuntivo, representando o concluído em relação a um universo hipotético.
- C) pretérito perfeito do indicativo, indicando o fato concluído em um intervalo de tempo anterior a um ponto de referência presente.
- D) presente do indicativo, representando o fato não concluído, no momento da enunciação.
- E) mais-que-perfeito do indicativo, representando o fato como concluído, situando-o em um intervalo de tempo anterior a um ponto de referência passado.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) “A posição subordinada de menina solteira não se compadecia com a sua idade” = A posição subordinada de menina solteira não compadecia-se com a sua idade.
- B) “ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!” = ela era muito capaz de enfiá-los a todos pelo ouvido de uma agulha!
- C) “– Ele já a devia conhecer melhor!” = – Ele já devia conhecer-lhe melhor!
- D) “Se a supunham uma toleirona, enganavam-se.” = Se a supunham uma toleirona, se enganavam.
- E) “Mme. Brizard fez um gesto de dúvida.” = Mme. Brizard fez um gesto à dúvida.

Questão 06

No fragmento “E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão.” as orações estabelecem entre si uma relação de:

- A) consequência e finalidade.
- B) causa e efeito.
- C) quantificação e qualificação.
- D) contraste.
- E) adição e preterição.

Questão 07

A primeira oração do segmento “se não abrimos os olhos... adeus casamento!”, como efeito expressivo, apresenta um(a):

- A) pleonasma.
- B) paradoxo.
- C) metáfora.
- D) hipérbole.
- E) prosopopeia.

Questão 08

Os termos destacados em “SE a supunham uma toleirona, enganavam-SE.”, no contexto, são, respectivamente:

- A) conjunção integrante e pronome reflexivo.
- B) pronome apassivador e pronome indefinido.
- C) pronome reflexivo e pronome reflexivo.
- D) conjunção adverbial e pronome reflexivo.
- E) partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito.

Questão 09

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “– Ora, continuou o OUTRO gravemente.”, o termo destacado é um substantivo.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências do trecho “Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna!”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “Às vezes tinha vontade de acabar com ISSO.”, refere-se a “Que diabo significavam tais cautelas?”

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) II.
- B) I.
- C) I e III.
- D) II e III.
- E) I e II.

Questão 10

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “Mme. Brizard ESCUTAVA, sem DESPREGAR os olhos de um ponto, os pés cruzados e com uma das mãos APOIANDO-se no espaldar da cama.”.

- I. As três formas verbais são núcleos do predicado das orações a que pertencem.
- II. Os três verbos indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O terceiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) II.
- C) I e II.
- D) I.
- E) I e III.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**Questão 11**

Considerando os fundamentos e diretrizes da atenção básica, analise as afirmativas a seguir.

- I. A atenção básica deve ter território adstrito, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais.
- II. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização do serviço de saúde que regule a entrada do usuário e reduza os serviços de porta aberta.
- III. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) I e III.
- C) II.
- D) III.
- E) I e II.

Questão 12

Assinale a alternativa que corresponde a uma responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde em relação à atenção básica.

- A) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- B) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados pelos municípios por meio dos sistemas informatizados, retornando informações aos gestores municipais.
- C) Analisar os dados de interesse estadual, gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.
- D) Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- E) Inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica.

Questão 13

Conforme recomendação da Política Nacional da Atenção Básica a respeito das especificidades das Equipes de Saúde da Família – ESF analise as afirmativas a seguir.

- I. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável, no máximo, 3.500 pessoas, sendo a média recomendada de 2.000 pessoas.
- II. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- III. Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em apenas uma equipe, com exceção do profissional médico que pode atuar em até 3 ESF.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) III.
- C) II.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 14

O “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” corresponde à definição do seguinte princípio do SUS:

- A) universalidade.
- B) descentralização.
- C) equidade.
- D) integralidade.
- E) hierarquização.

Questão 15

Marque a alternativa que corresponde a uma das prioridades do Pacto pela Vida.

- A) Saúde do homem
- B) Saúde do trabalhador
- C) Redes de urgência
- D) Alta complexidade
- E) Promoção da saúde

Questão 16

A Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do SUS teve por finalidade primordial promover e consolidar o(a):

- A) pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- B) Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência.
- C) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), como uma das condições de gestão dos sistemas municipais de saúde.
- D) processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- E) conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal.

Questão 17

De acordo com as disposições legais acerca da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os Estados e o Distrito Federal devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos previstos em lei.
- II. Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos Municípios.
- III. Os recursos da União destinados a investimentos nas ações públicas de saúde terão sua programação realizada semestralmente.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) I.
- C) II.
- D) I e II.
- E) III.

Questão 18

O Decreto nº 7.508/2011 define a Rede de Atenção à Saúde como:

- A) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais econômicas e sociais.
- B) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência.
- C) foro de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.
- D) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- E) modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade.

Questão 19

A Lei nº 8.080/1990 determina que os critérios e valores para a remuneração dos serviços prestados pela iniciativa privada devem ser estabelecidos pela direção nacional do SUS e aprovados pelo(a):

- A) Conselho Municipal de Saúde.
- B) Comissão Intergestores Tripartite.
- C) Comissão Intergestores Bipartite.
- D) Conselho Nacional de Saúde.
- E) Conselho Estadual de Saúde.

Questão 20

Analise as afirmativas a seguir em relação aos Conselhos de Saúde:

- I. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- II. Os Conselhos de Saúde são instâncias responsáveis por avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- III. Os Conselhos de Saúde devem se reunir a cada dois anos com representação majoritária dos profissionais de saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II.
- C) II e III.
- D) III.
- E) I.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Conforme a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, somente é permitida a esterilização voluntária na seguinte situação:

- A) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- B) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- C) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de dezoito anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- D) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e oito anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- E) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e sete anos de idade ou, pelo menos, com três filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.

Questão 22

Em todas as consultas de pré-natal, deve-se determinar o peso e calcular o índice de massa corporal (IMC), monitorando o ganho de peso corporal. A recomendação de ganho de peso (kg) total na gestação em uma gestante com IMC maior que 30 kg/m² é:

- A) 11,5-16
- B) 10-11,5
- C) 5,0-9,0
- D) 12,5-18,0
- E) 7,0-14

Questão 23

São fatores de risco que indicam o encaminhamento da gestante à urgência/emergência obstétrica:

- A) infecção urinária de repetição e suspeita de pré-eclampsia.
- B) gemelaridade e diabetes mellitus gestacional.
- C) IG a partir de 41 semanas confirmadas e oligodrômio.
- D) hipertermia e antecedente de trombose venosa profunda.
- E) edema e hipertensão arterial.

Questão 24

A introdução de alimentos na dieta da criança deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno. Com qual idade e como se deve iniciar a alimentação complementar?

- A) Com quatro meses; adicionando uma papa de frutas no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã, uma papa de fruta no meio da tarde e uma papa salgada no final da tarde.
- B) Com seis meses; uma refeição pela manhã, uma refeição básica da família no final da manhã e uma refeição básica da família no final da tarde.
- C) Com dois anos; uma refeição pela manhã, uma fruta, uma refeição básica da família no final da manhã, uma fruta e uma refeição básica da família no final da tarde.
- D) Com doze meses; adicionando uma papa de frutas no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã e uma papa de fruta no meio da tarde.
- E) Com seis meses; adicionando uma papa de frutas no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã e uma papa de fruta no meio da tarde.

Questão 25

Apesar da acentuada diminuição da ocorrência de tracoma nas últimas décadas, o agravo persiste acometendo especialmente populações carentes de todas as regiões do país, sendo importante que a equipe de saúde conheça suas manifestações clínicas e formas de transmissão. Sabendo disso marque a alternativa que corresponde às suas formas de transmissão.

- A) Contato direto, pessoa a pessoa, ou contato indireto, por meio de objetos contaminados (toalhas, lenços, fronhas). As moscas podem contribuir para a disseminação da doença, por transporte mecânico.
- B) Pessoa a pessoa, pelo contato direto ou por secreções respiratórias (disseminação aérea de partículas virais/aerossóis) e, raramente, através de contato com lesões.
- C) Transmitida de pessoa a pessoa, principalmente, através do ar, por gotículas eliminadas pelo indivíduo infectado.
- D) Ingestão de oocisto e infecção transplacentária.
- E) A transmissão ocorre pela introdução dos esporos em uma solução de continuidade da pele e mucosas (ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza).

Questão 26

É uma doença que deve ser notificada ao setor de vigilância epidemiológica e investigada obrigatoriamente:

- A) estrogiloidíase.
- B) criptococose.
- C) coccidiodomicose.
- D) cancro mole.
- E) enterobíase.

Questão 27

Os procedimentos para a administração da vacina por via intradérmica são:

- A) higienizar as mãos; checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; fazer a limpeza da pele com algodão e álcool a 70%, introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha e fazer compressão no local de administração.
- B) checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; colocar as luvas; fazer a limpeza da pele com algodão e álcool a 70%, introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha; não fazer compressão no local de administração e higienizar as mãos.
- C) higienizar as mãos; checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; fazer a limpeza da pele com algodão seco; introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha; não fazer compressão no local de administração da vacina e higienizar as mãos.
- D) higienizar as mãos; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; colocar as luvas; fazer a limpeza da pele com algodão seco, introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha; não fazer compressão no local de administração e higienizar as mãos.
- E) higienizar as mãos; checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; fazer a limpeza da pele com algodão e álcool a 70%, introduzir a seringa com bisel da agulha para baixo; injetar a vacina; retirar a agulha e fazer compressão no local de administração.

Questão 28

O HIV apresenta um neurotropismo bastante acentuado, levando, frequentemente, ao aparecimento de síndromes neurológicas específicas, particularmente nas fases mais avançadas da infecção. São manifestações neurológicas mais frequentes:

- A) neuropatias periféricas e mielopatia vacuolar.
- B) parestesia e afasia.
- C) dor de cabeça alta e delírio.
- D) distonia e mioclonias.
- E) neurite óptica e encefalopatia crônica.

Questão 29

Se um indivíduo, ao ser diagnosticado com diabetes mellitus, não alcançar a meta glicêmica em até três meses com as medidas não farmacológicas, o tratamento preferencial é acrescentar a metformina no plano terapêutico, devido aos seus muitos benefícios. As contraindicações para o uso de metformina têm se reduzido com a maior experiência de uso, mas mantém-se a contraindicação em pacientes com:

- A) câncer hepático.
- B) insuficiência cardíaca.
- C) insuficiência hepática.
- D) insuficiência renal.
- E) câncer pancreático.

Questão 30

A insulina de ação intermediária ou NPH tem como início de ação e duração, respectivamente:

- A) 2 - 3 horas e 9 - 15 horas.
- B) 30 a 60 minutos e 8 - 10 horas.
- C) 1 - 3 horas e 8 - 10 horas.
- D) 2 - 4 horas e 10 - 12 horas.
- E) 2 - 4 horas e 12 - 18 horas.

Questão 31

Os anti-hipertensivos são geralmente bem tolerados, entretanto cerca de um terço dos doentes atribui sintomas a estes fármacos, quando em tratamento de longo prazo. O reconhecimento dessas queixas e adequada orientação são necessários, pois eventos indesejáveis são causa frequente de falta de adesão ao tratamento. Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta alguns dos efeitos adversos dos antiadrenérgicos de ação central.

- A) Sonolência, boca seca e hipotensão postural
- B) Tosse seca, alteração de paladar e taquicardia reflexa
- C) Hipotensão postural, tosse seca e tontura
- D) Broncoespasmo, bradicardia e hipotensão postural
- E) Hipotassemia, hiperuricemia e intolerância à glicose

Questão 32

A maioria dos indivíduos com hipertensão possui a elevação persistente da pressão arterial como resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão, o que a define como essencial. Já a HAS secundária possui causa definida, que é potencialmente tratável e/ou curável, acometendo menos de 3% dos hipertensos. A correta avaliação destes pacientes é fundamental, visto que pode determinar a interrupção dos anti-hipertensivos. As causas mais comuns de HAS secundária são as:

- A) infecciosas (sepse, doença de Lyme).
- B) renais (rim policístico, doenças parenquimatosas).
- C) vasculares (fibrilação atrial, miocardite).
- D) hematológicas (hemofilia, trombocitopenia).
- E) endócrinas (doença de Addison, hipocalcemia).

Questão 33

No estágio invasor do câncer do colo do útero as principais manifestações clínicas são:

- A) dismenorreia, disúria e hematúria.
- B) sangramento vaginal (espontâneo, após coito ou esforço), leucorreia e dor pélvica.
- C) secreção uretral, epidídimo muito doloroso, ocasionalmente com edema ou tumefação.
- D) dor à palpação da região suprapúbica e nódulos dolorosos nos ligamentos uterossacrais.
- E) hematúria e linfedema unilateral.

Questão 34

A mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher. Marque a alternativa que apresenta a população-alvo e a periodicidade dos exames no rastreamento do câncer de mama corretas.

- A) Mulheres de 25 a 35 anos - ECM e mamografia a cada 2 anos.
- B) Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado - ECM semestral e mamografia anual.
- C) Mulheres de 40 a 49 anos - ECM anual e mamografia a cada 2 anos.
- D) Mulheres de 40 a 49 anos - ECM anual e, se alterado, mamografia.
- E) Mulheres de 50 a 69 anos - ECM e mamografia anual.

Questão 35

O carcinoma de células renais representa mais de 90% dos processos malignos renais em adultos, sendo importante sua identificação precoce. Os sinais e sintomas clássicos são:

- A) dor esquelética e anemia grave.
- B) proteinúria, oligúria e dor uretral.
- C) hematúria, dor abdominal e massa em abdome ou flanco.
- D) febre, letargia e hipertensão arterial.
- E) náusea/vômitos e diminuição de débito urinário.

Questão 36

Um dos fatores de risco para a doença arterial coronária é:

- A) homocisteína e lipoproteínas baixas.
- B) pacientes jovem (idade menor que 45 anos).
- C) disfagia e alcoolismo.
- D) dislipidemia e diabetes mellitus.
- E) hiperlipidemia e hiperuricemia.

Questão 37

O exame de urina simples (EAS) avalia as características físicas da urina e revela através de sua interpretação a presença de possíveis doenças. A densidade da urina menor que 1,005 é típica em:

- A) glomerulonefrite aguda.
- B) infecção renal.
- C) diabetes insípido.
- D) síndrome nefrótica.
- E) síndrome de Cushing.

Questão 38

A gravidez é um período que provoca muitas alterações no corpo da mulher, este período vai desde a fecundação até o nascimento. As principais queixas das gestantes no segundo trimestre da gestação são:

- A) desmaios, fraqueza e estrias.
- B) lombalgia e secreção vaginal.
- C) sensibilidade das mamas e poliúria.
- D) sialorreia e constipação intestinal.
- E) edema de membros inferiores, veias varicosas e sinais de pré-eclâmpsia.

Questão 39

Considera-se ter ocorrido abortamento quando há interrupção da gestação:

- A) antes da 15ª semana de gestação.
- B) antes da 22ª semana de gestação.
- C) após a 8ª semana de gestação.
- D) entre a 10ª e a 20ª semana de gestação.
- E) até a 12ª semana de gestação.

Questão 40

O tempo de protrombina (TP) é um exame realizado com intuito de determinar o tempo necessário para que se forme um trombo de fibrina em uma amostra de plasma com citrato. O resultado normal esperado para o tempo de protrombina deve variar de:

- A) 10 a 14 segundos.
- B) 8 a 12 segundos.
- C) 5 a 10 segundos.
- D) 14 a 18 segundos.
- E) 1 a 5 segundos.

Questão 41

Além de encaminhar a criança para consulta odontológica, toda a equipe de saúde deve estar apta a dar informações adequadas aos pais e aos cuidadores sobre a saúde bucal das crianças. A primeira informação importante é sobre a cronologia da erupção dentária. Com relação a isso marque a alternativa correta.

- A) O mais comum é que os dentes decíduos comecem a erupcionar aos 9 meses de idade.
- B) É possível que haja retardo na erupção, o que não deve ser motivo de preocupação até os 15 meses de idade.
- C) Por volta dos 18 meses aparecem os molares decíduos.
- D) Aos 20 meses de idade, deve estar completa a dentição decídua, que consta de 10 dentes superiores e 10 inferiores.
- E) Após os dois anos de idade da criança, se não ocorreu a erupção, é necessário investigar o caso, pois existe a possibilidade de ocorrer anadontia.

Questão 42

O desenvolvimento infantil se dá à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo de acordo com os meios onde vive e os estímulos deles recebido. A criança é capaz de sentar-se sem apoio:

- A) entre nove meses e um ano.
- B) em torno do décimo mês.
- C) entre seis e oito meses.
- D) entre quatro e seis meses.
- E) a partir do sétimo mês de vida.

Questão 43

As equipes de saúde da família (ESF) trabalham com uma população adscrita, ou seja, com um número fixo de famílias. De uma forma geral, recomenda-se que cada ESF assista de:

- A) 1.000 a 2.000 famílias, com o limite máximo de 5.000 habitantes.
- B) 400 a 700 famílias, com o limite máximo de 4.000 habitantes.
- C) 600 a 1.000 famílias, com o limite máximo de 4.500 habitantes.
- D) 1.000 a 1.500 famílias, com o limite máximo de 4.800 habitantes.
- E) 500 a 1.000 famílias, com o limite máximo de 3.000 habitantes.

Questão 44

A temperatura é um importante sinal vital e sua alteração pode indicar o acometimento por alguma doença. É considerado piroxia quando a temperatura estiver entre:

- A) 40 e 41 °C.
- B) 38 e 39 °C.
- C) 39 e 40 °C.
- D) 37,5 e 38 °C.
- E) 36,9 e 37,4 °C.

Questão 45

Um das atribuições do Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família no controle da doença de Chagas é:

- A) solicitar exames complementares conforme rotina e os adicionais quando forem necessários.
- B) auxiliar na coleta e encaminhamento de exames, se necessário.
- C) identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade Básica de Saúde.
- D) enviar os boletins de notificação para digitação.
- E) gerenciar os insumos necessários para o diagnóstico e tratamento adequado dos casos agudos e crônicos.

Questão 46

A deficiência por vitamina A é responsável por uma série de problemas de saúde, podendo causar, principalmente:

- A) bócio.
- B) cretinismo.
- C) anemia.
- D) cegueira noturna.
- E) retardo mental.

Questão 47

As formas de sofrimento mental puerperal devem ser diagnosticadas e assistidas precocemente, a fim de auxiliar em uma relação mãe-bebê satisfatória no âmbito familiar, social, físico e psicológico. Em geral, as alterações emocionais repercutem na interação mãe-filho de forma negativa e promovem um desgaste na relação com os familiares e na vida afetiva do casal. Com relação aos sofrimentos mentais marque a alternativa correta.

- A) O transtorno psicótico puerperal ocorre entre 10 a 15% das mulheres, Desenvolve-se lentamente em semanas ou meses, atingindo assim um limiar, após isso apresenta remissão espontânea até o 8º mês após o parto.
- B) A tristeza puerperal ocorre entre 50 a 80% das mulheres, iniciando-se no 3º até o 4º dia do puerpério, apresentando remissão espontânea de uma semana a dez dias.
- C) A depressão puerperal ou depressão pós-parto ocorre entre 0,1 a 0,2% das mulheres, inicia-se da 1ª a 2ª semana após o parto, pode evoluir mais tarde para o transtorno psicótico puerperal.
- D) A depressão puerperal ou depressão pós-parto ocorre entre 15 a 20% das mulheres, inicia-se de forma lenta entre o 1º e o 2º mês após o parto, o prognóstico depende da identificação precoce e das intervenções no quadro.
- E) A tristeza puerperal ocorre entre 20 a 30% das mulheres, iniciando-se no 1º até o 4º dia do puerpério, desenvolvendo-se lentamente, podendo evoluir mais tarde para uma depressão.

Questão 48

A dengue é uma doença única, sistêmica e dinâmica. Isso significa que a doença pode evoluir para remissão dos sintomas ou agravar-se exigindo constante reavaliação e observação, para que as intervenções sejam oportunas e que os óbitos não ocorram. Antes que ocorra o agravamento da dengue, alguns sinais de alarme podem surgir. Por meio destes sinais se tem conseguido identificar os pacientes que podem evoluir para uma forma grave da doença, com a intenção de prevenir gravidade e reduzir a mortalidade por dengue. Alguns desses sinais de alarme são:

- A) febre, mialgia e hipotensão postural.
- B) dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e aumento progressivo do hematócrito.
- C) anorexia, sangramento de mucosa e letargia.
- D) extravasamento de plasma, derrame pleural aumento progressivo de hematócrito.
- E) sangramento de mucosa, artralgia e exantema.

Questão 49

No trabalho de parto o primeiro cuidado que o enfermeiro deve ter com o recém-nascido, é:

- A) prevenir a perda de calor.
- B) realizar a profilaxia da oftalmia e da vulvovaginite gonocócica.
- C) aspirar as vias aéreas.
- D) realizar a profilaxia da doença hemorrágica do RN.
- E) manter as vias aéreas pérvias, posicionando a cabeça do RN com uma leve flexão do pescoço.

Questão 50

A doença que tem como agente etiológico a *Bordetella pertussis*, é denominada:

- A) de Chagas.
- B) criptosporidíase.
- C) cancro mole.
- D) coqueluche.
- E) de Lyme.