

Cargo: S02 - ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**Disciplina: Conhecimentos Específicos**

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
23	IG a partir de 41 semanas confirmadas e oligodrâmio.	Segundo, Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco: A infecção urinária de repetição é um fator de risco que indica o encaminhamento da gestante para o pré-natal de alto risco, realizado em um hospital de referência; não sendo um fator de risco para o encaminhamento da gestante à urgência e emergência obstétrica. Edema não é mais considerado critério diagnóstico (grau de recomendação C). O Ministério da Saúde aponta como fatores de risco: IG a partir de 41 semanas confirmadas, oligodrâmio, entre outras.	INDEFERIDO	-
26	Coccidiodomicose.	Segundo o Ministério da Saúde. Departamento de vigilância epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso, 2010. A coccidiodomicose por tratar-se de agravo inusitado, todo caso deve ser notificado ao setor de vigilância epidemiológica e investigado obrigatoriamente.	INDEFERIDO	-
29	insuficiência renal.	Segundo o Ministério da Saúde, Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. As contraindicações para o uso de metformina têm se reduzido com a maior experiência de uso, mas mantém-se a contraindicação em pacientes com insuficiência renal (filtração glomerular <30 ml/min/1,73m ²).	INDEFERIDO	-
30	2-4 horas e 12-18 horas.	Segundo o Ministério da Saúde, Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. A insulina NPH (ação intermediária) tem seu início de 2 a 4 horas, pico de 4 a 10 horas e duração entre 12 e 18 horas.	INDEFERIDO	-
35	Hematúria, dor abdominal e massa em abdome ou flanco.	Foi solicitado na questão os sinais e sintomas clássicos do carcinoma de células renais, ou seja, aqueles que estão presentes em grande parte dos casos e que leva a suspeita da doença. Segundo Kahan, Scott. A tríade clássica para essa doença são: hematúria, dor abdominal e massa em abdome ou flanco.	INDEFERIDO	-
40	10 a 14 segundos.	Conforme, Guanabara Koogan, exames diagnósticos: finalidade, procedimento, interpretação: o tempo de protrombina deve oscilar de 10 a 14 segundos dependendo da fonte de	INDEFERIDO	-

		tromboplastina tecidual e do tipo de dispositivo sensor utilizado para medir a formação do coágulo.		
41	Por volta dos 18 meses aparecem os molares decíduos.	Segundo o Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento: O mais comum é que os dentes decíduos (de leite) comecem a erupcionar em torno dos 6 meses. Após um ano de idade (12 meses) da criança, se não ocorreu a erupção, é necessário investigar o caso, pois existe a possibilidade (rara) de ocorrer anadontia. Por volta dos 18 meses aparecem os molares decíduos, o que vai exigir maiores cuidados de limpeza. Aos 36 meses, deve estar completa a dentição decídua, que consta de 10 dentes superiores e 10 inferiores.	INDEFERIDO	-
43	600 a 1000 famílias, com o limite máximo de 4.500 habitantes.	Em resposta ao recurso interposto, a banca esclarece que houve erro material na afirmação do limite máximo de 4.500 habitantes, onde mesmo apresentando a informação correta sobre a quantidade de famílias (600 a 1000), a questão não possui alternativa correta. Fato esse evidenciado pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição, sendo de 600 a 1000 famílias. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e conseqüente anulação da questão, tendo em vista que não há resposta correta entre as alternativas.	DEFERIDO	ANULADA
45	Gerenciar os insumos necessários para o diagnóstico e tratamento adequado dos casos agudos e crônicos.	Segundo, Ministério da saúde, Departamento de Atenção Básica. Vigilância em saúde: zoonoses: Uma das atribuições do enfermeiro do Programa Saúde da Família no controle da doença de Chagas é Gerenciar os insumos necessários para o diagnóstico e tratamento adequado dos casos agudos e crônicos. Enviar os boletins de notificação para digitação é uma atribuição do microscopista; Identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade Básica de Saúde é uma atribuição do agente comunitário; Auxiliar na coleta e encaminhamento de exames, se necessário é uma atribuição do auxiliar ou técnico de enfermagem; Solicitar exames complementares conforme rotina e os adicionais quando forem necessários é uma atribuição do médico.	INDEFERIDO	-